



# Juhend naistele, kes võivad raseduda, on rasedad või imetavad rinnalast



Koroonaviiruse vastast vaktsiini on selle ohutuse kindlakstegemiseks palju testitud.



Kui olete rase, tuleks teil iseene ja imiku kaitseks kaks koroonaviiruse vastase vaktsiini annust saada. Vaktsiinid ei nakata teid ega teie sündimata last koroonaviirusega.



Koroonaviiruse vastast vaktsiini manustatakse kahe süstega. Kui saite esimese süste enne rasedumist, võite minna ja teise süste saada, tingimusel, et teil ei esinenud esimese süste järgselt raskeid kõrvalmõjusid.



Rasedate naiste jaoks eelistatakse Pfizeri ja Moderna koroonaviiruse vastaseid vaktsiine. Kui saite esimese Astrazeneca süste, võite te seda ka teise süstega saada, ent konsulteerige arsti või medõega trombiriski küsimuses.



Imetamine on teie ja teie imiku jaoks väga hea.



Vaktsineerimise ja Immuniseerimise Ühiskomitee (JCVI) ekspertide sõnul võite te vaktsiini saada, kui teie laps on rinnatoidul.

Ülemaailmne Tervishoiuorganisatsioon (WHO) on samuti nõus sellega, et imetavad naisterahvad võivad vaktsiini saada.



Kui olete lapse sünnitanud, peaksite võimalikult kiiresti vaktsiini saama.



Vaktsiini saamise järgselt on rasestumine ohutu.



Vaktsineerimine, mis aitab kaitsta kõige kaitsetumaid.