



אנווייזונגען פאר פרויען וואס קענען מעגליך טראגעדיג ווערן, וואס זענען טראגעדיג אדער זייגן אצינד זייער קינד

אויב איר זענט טראגעדיג, דארפט איר האבן צוויי דאזעס פון קאראנאווירוס וואקצין כדי צו באשיצן זיך אליין און אייער נאך נישט געבוירן קינד. די וואקצינען קענען נישט געבן די קאראנאווירוס אינפעקציע צו אייך אדער אייער נאך נישט געבוירן קינד.



די קאראנאווירוס וואקצין האט געהאט א סך טעסטן כדי צו מאכן זיכער אז עס איז נישט שעדליך.



די Moderna און Pfizer קאראנאווירוס וואקצינען זענען בעסער פאר טראגעדיגע פרויען. אויב איר האט געהאט אייער ערשטע דאזע מיט Astrazeneca, קענט איר עס האבן פאר אייער צווייטע דאזע, אבער רעדט קודם מיט אייער דאקטאר אדער שוועסטער וועגן די סכנה פון בלוט קלאטס (blood clots).



די קאראנאווירוס וואקצין ווערט געגעבן אין צוויי איינשפריצן. אויב איר האט געהאט די ערשטע איינשפריץ איידער איר זענט טראגעדיג געווארן, קענט איר יא האבן די צווייטע איינשפריץ, אויב איר האט נישט געהאט קיין ערנסטע ביי-עפעקטן נאך די ערשטע איינשפריץ.



מומחים אויף דעם צוזאמגעשטעלטן קאמיטעט איבער וואקצינאציע און אימוניזאציע (JCVI) זאגן אז מען קען האבן די וואקצין ווען מען זייגט.

די וועלטליכע געזונט ארגאניזאציע (WHO) שטימט אויך צו אז פרויען וואס זייגן קענען יא האבן די וואקצין.



זייגן איז גאר גוט פאר אייך און אייער קינד.



עס איז פארזיכערט פאר אייך טרעגעדיג צו ווערן נאכדעם וואס איר האט געהאט די וואקצינען.



אויב אייער בעיבי איז שוין געבוירן געווארן, זאלט איר האבן אייערע וואקצינען ווי אמשנעלסטן.



וואקצינאציע העלפט צו באשיצן די שוואכסטע.