

# ځنگه کولی شو خپل ماشوم له RSV ناروغۍ خوندي وساتو

د مېندواره بڼځو لپاره د RSV  
واکسين په اړه لارښود.



مېندواره بڼځې کولی شي د خپلې هرځل مېندوارۍ پرمهال په وړيا ډول واکسين  
وکړي، ترڅو خپل ماشومان له RSV ناروغۍ څخه خوندي وساتي.

## ولې باید خپل نوي زېږېدلي ماشومان له RSV ناروغۍ خوندي وساتو؟

(RSV) یو ډول عامه د سپرو ناروغي ده چې د برانشیولیت په نامه یادېږي. په تنکیو ماشومانو کې دغه ناروغي د دې لامل کېږي چې ماشومان په سختې سره ساه واخلي او په سختې سره خواړه میل کړي. د دغې ناروغۍ ډېری مورد بڼايي په کور کې تداوي شي خو په انگلستان کې هر کال د یادې ناروغۍ له امله شاوخوا 20,000 نوي زېږېدلي ماشومان په روغتونونو کې بستر کېږي. هغه نوي زېږېدلي ماشومان چې شدیدې bronchiolitis ناروغي لري بڼايي جدي درملنې ته اړتیا ولري او کېدای شي دغه ناروغي د هغوی لپاره وژونکې وي. د RSV ناروغي بڼايي په هغو کم عمره نویو زېږېدلیو، بې وخته زېږېدلیو او هغو ماشومانو کې ډېره شديده وي چې په قلب، تنفسي یا د بدن په دفاعي سیستم باندې اغېزه درلودونکې ناروغي لري. RSV ناروغي کېدای شي د کال په هره برخه کې شیوع وکړي خو شدت یې هر کال په ژمي کې وي.

## RSV ناروغي څنگه خورېږي؟

RSV یوه خورا ساري او په آسانۍ سره خورېدونکې ناروغي ده چې په ځانګړي ډول د ماشومانو ترمنځ د ټوخي او پرنجې له لارې خورېږي. حتی د ساده تدابیرو لکه د لاسونو مینځل، ټوخي او پرنجې پرمهال د پوږې یا خولې په پټولو سره هم په کورنۍ کې د دغې ناروغۍ له خورېدو څخه مخنیوی ستونزمن کار دی. د مېندوارۍ پرمهال له RSV نارغۍ څخه د خپل ماشوم د مصونۍ ساتو لپاره ترټولو غوره لار د واکسینو تطبیق دی.

## د RSV واکسین تر کومې کچې مؤثر دی؟

د دغه واکسین په تطبیق سره ستاسو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کېږي او د وایروس پر وړاندې په بدن کې انټي باډي تولیدوي. دغه انټي باډي بیا ستاسو له بدن څخه جنین ته انتقال کوي ترڅو له زېږون وروسته ماشوم مصون وساتي. د RSV واکسینو تطبیق تر لومړیو شپږو میاشتو پورې په شديده bronchiolitis ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ تر 70% پورې راټیټوي. شپږ میاشتې وروسته ستاسو نوی زېږېدلی ماشوم د شدیدې RSV ناروغۍ د ټیټې کچې ګواښ سره مخ وي. د لوړ عمر ماشومان او لویان هم کېدای شي په RSV اخته شي، خو په کوچنیو ماشومانو او 75 کلنو او تر دې د لوړ عمر لرونکو لویانو کې دغه دغه ناروغي ډېره شديده ده.

## څه وخت باید واکسین وکړو؟

دغه واکسین باید تاسو ته د جنینو د سقط اړونده لیدزمنې یا ملاقات وروسته په 28مه اونۍ وړاندې شي. که چېرې تاسو تردې دمه په دې اړه څه نه وي اورېدلي، د لیدزمنې یا ملاقات چمتو کولو په موخه د خپلې ولادي څانګې یا GP یعنې عمومي ډاکټر سره په اړیکه کې شئ. د جنینو د سقط په 28مه اونۍ یا څو اونۍ وروسته د واکسینو تطبیق تاسو سره مرسته کوي چې له زېږون مخکې د خپل ماشوم د دنیا ته راورو په موخه په کافي اندازه انټي باډي جوړ کړي. په دې سره به ستاسو ماشوم ته حتی که له وخت مخکې زېږېدلی هم وي، ترټولو غوره مصونیت رامنځ ته شي.

تاسو د خپلې مېندوارۍ په وروستیو کې هم کولی شئ دغه واکسین تطبیق کړئ خو اغېز یې بڼايي یو څه کم وي. که چېرې دا ممکنه نه وه چې خپل واکسین په وخت سره وکړئ، نو کولی شئ ترهغې چې ماشوم مو دنیا ته نه وي راوړی داغه واکسین تطبیق کړئ. که چېرې تاسو دغه واکسین د مېندوارۍ په وروستیو کې تطبیقوئ، بیا هم کولی شئ له ناروغۍ مو وساتي او ستاسو نوي زېږېدلي ماشوم ته د هغې د انتقال ګواښ کم کړي.

## ایا زه به کومې اړخیزې اغېزې ولرم؟

کېدای شي د تزریق یا پیچکاري په ساحه کې یو څه تخریش یا سوروالی رامنځ ته شي چې دغه ستونزه د یوې یا دوو ورځو په موده کې له منځ ځي. همدارنګه کېدای شي د 1وې یا 2وې ورځو لپاره سردرد یا د عضلاتو درد ولرئ.

په لویانو کې د واکسینو له تطبیق وروسته د عصابي کېدو پېښه چې له امله یې ضعف یا کمزوري رامنځ ته کېږي او د Guillain-Barré syndrome په نامه یادېږي، په ډېر ندرت سره پېښېږي. ورته حالت د یو لړ عامه ناروغيو او ځینو واکسینو له تطبیق وروسته هم رامنځ ته کېږي. دا ډول حالت یا وضعیت په ځوانانو کې عام نه دی او تراوسه هېڅ داسې شواهد نشته چې د واکسینو تطبیق دې په مېندواره بڼڅو کې د Guillain-Barré سندروم خطر زیات کړي.

## آيا د مېندواري په موده كې د RSV واکسين تطبيق زما د ماشوم لپاره مصون دی؟

د كليني څېړنو له مخې شاوخوا 4,000 او د ملي پروگرامونو له مخې په زرگونو نورو مېرمنو ته دغه واکسين تطبيق شوي دي. د امريكا په متحده ايالاتو كې ارقام بندي چې دغه واکسين تر 300,000 ډېرو مېرمنو ته تطبيق شوي چې غوره مصونيت يې رامنځ ته كړي. عمومي كلينيكي څېړنې بندي چې د واکسين له تطبيق وروسته په لورمۍ مياشت كې د نارسو زېږېدليو ماشومانو تعداد يو څه ډېر (2.1%) وو چې واکسين يې تطبيق كړي نسبت هغو ته چې واکسين يې نه دي تطبيق كړي (1.9%). دا توپير په لور احتمال سره بڼايي چې چانس وي. دغه واکسين په انگلستان، اروپايي اتحاديې او متحده ايالاتو كې د درملو د تنظيم د اړونده ادارو لخوا د كيفيت او مصونيت له اړخه تائيد شوی دی.

## آيا د واکسينو تطبيق په دې مانا دی چې نور به زما ماشوم په RSV ناروغۍ نه اخته كېږي؟

واکسينو ثابته كړې ده چې په تطبيق سره به يې له شديدې RSV ناروغۍ څخه ستاسو د ماشوم د رنځ وړلو چانس كم وي. لكه د نورو درملو په شان، واکسين هم په بشپړ ډول اغېزمن نه وي او كېدای شي ځينې ماشومان د مور لخوا د دغه واکسين د تطبيق سره سره په RSV ناروغۍ اخته شي. نو د ډېری هغو ماشومانو لپاره چې ميندو يې واکسين كړي وي، بايد دغه ناروغي شديده نه وي.

تاسو كولى شئ د RSV واکسين په اړه چې د Abrysvo په نامه هم يادېږي، په دغه لېنك كې د ناروغ معلوماتي لارښود ولولئ: [www.medicines.org.uk/emc/product/15309/pil](http://www.medicines.org.uk/emc/product/15309/pil)

## كه چېرې مو ماشوم د لور گواښ سره مخ وي، څه بايد وكړو؟

ځينو هغو ماشومانو ته چې د RSV تر لور گواښ لاندې دي لكه تر وخت مخكې زېږېدلي ماشومان، د شديدې قلبي ناروغۍ درلودونكي ماشومان يا هغه چې د بدن كمزوری دفاعي سيستم لري، كېدای شي د تزريق په ډول د دغه واکسين د تطبيق سپارښتنه وشي. دغه واکسين به هغوی ته د هغو انټي باډي سربېره اضافي مصونيت رامنځ ته كړي چې له مور څخه يې ترلاسه كړي.

## آيا د هر ځل مېندواري پرمهال د RSV واکسينو تطبيق ته اړتيا ده؟

هوو، تاسو بايد د هر ځل مېندواري پرمهال دغه واکسين وكړئ ترڅو ستاسو ماشوم ته غوره مصونيت رامنځ ته كړي.

## آيا كولى شم د خپل RSV واکسين سره هم مهاله خپل نور د مېندواري واکسين هم وكړم؟

دا مهم ده چې د مېندواري پرمهال خپل واکسينونه په مناسب وخت كې وكړئ:

- د شنه توخي واکسين معمولا د مېندواري په لومړيو مرحلو كې (تقريباً د مېندواري په وسطي مرحله كې چې معمولا د مېندواري 20مه اونۍ كېږي) تطبيقېږي.
- تاسو بايد خپل د RSV واکسين د مېندواري په 28مه اونۍ وكړئ
- د والگي واکسين كولى شئ د مېندواري په هر مرحله كې وكړئ. تاسو بايد دغه واکسين د فرصت چمتو كېدو سره سم وكړئ

كه چېرې تاسو د RSV واکسين د تطبيق پرمهال خپل شنه توخي يا والگي واکسين نه وي كړي، نو بايد دواړه په عين وخت كې وكړئ.

## څنگه كولى شم په دې اړه نور معلومات ترلاسه كړم؟

تاسو كولى شئ په دې اړه د خپلې قابلې يا GP سره مشوره وكړئ، همدارنگه كولى شئ په دې اړه ترتيب شوی لارښود په لاندې لېنك كې مطالعه كړئ:

[www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-maternal-vaccination](http://www.gov.uk/government/publications/respiratory-syncytial-virus-rsv-maternal-vaccination)

[www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/vaccinations](http://www.nhs.uk/pregnancy/keeping-well/vaccinations)

د واکسينو په اړه د اضافي معلوماتو لپاره، لاندې لېنك ته مراجعه وكړئ:

[www.gov.uk/government/publications/pregnancy-how-to-help-protect-you-and-your-baby](http://www.gov.uk/government/publications/pregnancy-how-to-help-protect-you-and-your-baby)

## که چېرې په لاندې شرايطو کې ياست، نو د عاجل GP ملاقات غوښتنه وکړئ يا 111 شمېرې ته زنگ ووهئ:

- که چېرې ستاسو ماشوم زکام وي او حالت يې په خرابېدو وي
- که چېرې ستاسو ماشوم له نورمال حد څخه ډېر لږ خوراک کوي
- که چېرې ستاسو ماشوم په 12 ساعتونو کې يو ځل يا ډېر ځان چټلوي او يا هم د نس ناستې نور علانم پکې وي
- کله چې ستاسو ماشوم د 3 مياشتو وي او د بدن حرارت يې 38°C وي، او يا هم تر 3 مياشتې ډېر عمر ولري او د بدن د حرارت درجه يې 39°C يا تر دې لوړه وي.

## آيا شونې ده چې ماشوم مې RSV bronchiolitis ولري؟

د RSV bronchiolitis په اعراضو او علانمو کې ښايي لاندې

موارد شامل وي:

- د پزې بهېدل يا بندېدل
- په سختې، تېزې يا سغېدو سره ساه اخيستل
- په سختې سره خوراک کول
- ټوخی
- تبه
- نا آرامي
- سترې يا کھالت

دغه راز RSV کولی شي په تنکيو ماشومانو کې نور اعراض او علانم لکه تخته يا غوړمېدونکې ټوخی او په غوړ کې د ننه درد او داسې نور رامنځ ته کړي.

## د لاندې ستونزو په صورت کې 999 شمېرې ته زنگ ووهئ يا A&E ته مراجعه وکړئ:

- کله چې فکر کوئ ماشوم مو په جدې توگه نارامه ښکاري، ځان مطمئن کړئ. په لاندې شرايطو کې بايد ژر تر ژره اقدام وکړئ:
- کله چې ستاسو ماشوم په سختې سره ساه اخلي - په دې صورت کې ښايي ستاسو ماشوم په ساه اخيستو کې ستونزه ولري او غږ غږ وکړي، نس يې ولوېږي او د پوښتيو په منځ کې يې خاليگاوي ښکاره شي
- کله چې ستاسو ماشوم په وقفه يي ډول ساه اخلي
- کله چې ستاسو د ماشوم جلد، ژبه يا شونډې شنې کېږي
- کله چې ستاسو ماشوم نرمېږي يا کاهله کېږي او له خوبه نه پورته کېږي يا هم نه بيدېږي

تاسو کولی شئ د مشکوکو جانبي عوارض په اړه په Yellow Card وېب پاڼه کې او يا هم



0800 731 6789 شمېرې ته د زنگ وهلو له لارې چې له دوشنبه تر جمعې د سهار له 9am د مازديگر تر 5pm پورې په وړيا ډول د لاسرسي وړ ده، خپل راپور ثبت کړئ.

[www.mhra.gov.uk/yellowcard](http://www.mhra.gov.uk/yellowcard)

